

(一時保育)


### 緊急個別対応カード

児童氏名 ( ) 男・女

生年月日 ( 年 月 日 歳)

原因食物 ( )  
 アナフィラキシーショックの既往 (有・無)

内服薬 (有・無)  
 内服薬の保管場所 ( )  
 エピペン (有・無)  
 エピペン保管場所 ( )



発見者 (担任等) が事務室 (保健室) へ連れていく。 ※発症した子どもを独りにしない

保護者への連絡・救急車要請等  
 主治医・園医への対応

子どもの症状対応と状態観察  
 場合によっては現場へ急行する

職員への対応指示

優先順位 1

名前 (続柄 )

TEL

優先順位 2

名前 (続柄 )

TEL

優先順位 3

名前 (続柄 )

TEL

優先順位 4

名前 (続柄 )

TEL

優先順位 5

名前 (続柄 )

TEL

優先順位 6

名前 (続柄 )

TEL

主治医

病院名

医師名

TEL

緊急指定病院

病院名

ID

TEL

グレード①

皮膚症状  
部分的な蕁麻疹、赤み、かゆみ

粘膜症状  
軽い顔・まぶた・唇の腫れ

呼吸器症状  
鼻水、鼻づまり・単発の咳

消化器症状  
弱い腹痛 嘔気・単発の嘔吐

全身症状  
やや元気がない

安静、嚴重に経過観察 (症状が進まなくても、最低 1 時間)

必要に応じて主治医、園医、に連絡し指示を受ける

緊急時薬があれば内服

エピペンがあれば用意

グレード②

皮膚症状  
全身の蕁麻疹、赤み、強いかゆみ

粘膜症状  
顔全体の明らかな腫れ

呼吸器症状  
数回繰り返す咳

消化器症状  
腹痛 複数回の嘔吐・下痢

全身症状  
元気がない・横になりたがる

主治医、園医に連絡し指示を受ける

医療機関の受診 (必要に応じて救急車要請を考慮)

緊急時薬があれば内服

エピペンがあれば用意、必要に応じて接種

グレード③

器症状  
のどや胸が締め付けられる  
声がかれ 犬が吠えるような咳  
息がしにくい 持続する強い咳  
きこみ 喘鳴 (ゼーゼーヒューヒュー)

消化器症状  
強い腹痛 繰り返す嘔吐・下痢

全身症状  
意識低下～消失・失禁

救急車を要請し、医療機関を受診

エピペンを接種

必要に応じて蘇生術を実施

緊急時薬があれば内服

保護者へ連絡 ～連絡メモ～

- ①状態の報告
- ②主治医、園医へ連絡すること、救急車を呼ぶことの了解
- ③エピペンを投与することの了解
- ④保護者が施設や学校に来ることが可能か確認 (不可能な場合、代わりに来られる方へ連絡をいれてもらう)
- ⑤救急搬送先を伝える
- ⑥搬送先へ保護者が来ることが可能か確認 (不可能な場合、代わりに来られる方へ連絡を入れてもらう)